

K. Mondon, MD  
E. Beaufils  
D. Perrier  
A. Matysiak  
C. Hommet, MD, PhD

Address correspondence and  
reprint requests to Dr. Karl  
Mondon, Centre Mémoire de  
Ressources et de Recherche,  
Hôpital Bretonneau, 2 Bd  
Tonnelle, 37044 Tours, Cedex,  
France  
karl.mondon@med.univ-tours.fr

## 临床推理：

### 一位在自己家中迷路的59岁男性

#### Clinical Reasoning:

A 59-year-old man who became lost in his own home

Neurology 2010;74:e66-e68 但小娟译；王涛校

#### 第一部分

一所教学医院的记忆中心提供一位59岁右利手男性的病例，他有进行性认知功能减退的症状。他的既往病史包括高血压、糖尿病及前列腺癌，无精神病或神经病家族史。

患者的症状始于3年前，表现为记忆力丧失和寻词困难。6个月后，他的妻子发现其对于以前的爱好逐渐丧失兴趣并情感淡漠。患者在初发症状12个月后，开始出现开车时无法找到回家的路。同时，他的妻子观察到他人格改变，描述她的丈夫像个孩子，并说她走到哪里他就跟到哪里。一年后，患者出现阅读和拼写困难并变得不能事先做计划。他对事件的记忆恶化且对其熟悉的面孔识别困难。他沉溺于以前与儿子的一次冲突中。

他不能自主地完成日常活动。他在空间定向力的困难不断进展直到他最后在自己生活了10年的家中迷了路。在临床表现之前，患者开始出现与他同时存在的性欲丧失相比，更多不适宜的性评论。

入院时的神经心理评估显示，患者有严重的遗忘综合征、命名和言语理解困难，视空间受损，认知和行为的前额叶综合征，还包括面容失认在内的多方式视觉失认。其余神经检查正常。

#### 思考题：

1. 什么是早发型痴呆？
2. 早发型痴呆的病因是什么？
3. 其诊断策略是什么？

请转至第二部分